

Bestimmungshilfe für kleine Cypriniden in Fließgewässern (Jungfische & Kleinfische)

Die Bestimmungshilfe eignet sich für die häufigsten Arten ab ca. 3 cm Grösse.

Voraussetzung für die eindeutige Bestimmung der meisten Merkmale ist ein Beobachtungsgefäss.

Die Merkmalskombination von Afterflossen-Form und Maulstellung ist hilfreich für den Einstieg in die Bestimmung.

Fischart	Afterflosse / Maulstellung	Körperform, Flossen	Schuppen, Färbung, Varia	Fischart	
Alet	Gerade oder nur sehr wenig eingebuchtet	Endständig Kopf und Maul breit	Netzstruktur auf Schuppen	Alet	
Elritze		Rückenflosse weit NACH Bauchflossen Breiter boxiger Körper	Kleine (unsichtbare) Schuppen "Schnurrbart" (dunkler Strich über Maul), Goldige Farben	Elritze	
Barbe		Unterständig 4 Barteln	Sehr lang gestreckt	Fein gesprenkelt	Barbe
Gründling		Unterständig 2 Barteln	Sehr lang gestreckt	Reihe grosser, klarer Flecken auf den Seiten (können auch Längsband bilden)	Gründling
Rotfeder	Eingebuchtet	Oberständig Rückenflosse knapp NACH Bauchflossen Eher hochrückig		Rotfeder	
Laube		Afterflossenansatz reicht unter die Rückenflosse	Sehr silbrig, verliert grosse Schuppen rasch Hektisches Verhalten im Eimer / Beobachtungsgefäss	Laube	
Bitterling		Afterflossenansatz reicht unter die Rückenflosse Hochrückig, lange Rückenflosse	Grüner Glanzstreifen auf der Flanke	Bitterling	
Schneider		Endständig Afterflossenansatz reicht unter die Rückenflosse Leicht hochrückig	Eingefasste Seitenlinie; Jungfische mit schwarzem Strich im Nacken (Schnauze bis Rückenflosse)	Schneider	
Rotauge		Rückenflosse knapp VOR Bauchflossen	Auge mit rotem Glanz	Rotauge	
Hasel		Unterständig leicht ausgeprägt	Rückenflosse knapp NACH Bauchflossen	Hektisches Verhalten im Eimer / Beobachtungsgefäss Schlüpft ~ 1 Monat vor Nase, ist darum meist grösser	Hasel
Strömer		Rückenflosse knapp NACH Bauchflossen	Eingefasste Seitenlinie gelblich-orange Schlüpft früher als Schneider, ist darum meist ~ 2 cm grösser	Strömer	
Nase		Unterständig stark ausgeprägt	Rückenflosse knapp VOR Bauchflossen	Ruhiges Verhalten im Eimer / Beobachtungsgefäss Schlüpft ~ 1 Monat nach Hasel, ist darum meist kleiner	Nase

FOLGENDE CYPRINIDEN-ARTEN SIND IN DER TABELLE NICHT AUFGEFÜHRT: Karpfen, Schleie, Blicke, Brachsen, Moderlieschen sowie Neozoen und Tessiner Arten